

ジスロマック クラリスロマイシンの飲ませ方



このお薬は、表面にバナナ味のコーティングがされていますが、コーティングがはがれると中身は苦みがあります💧

いつもお子さんが行っている内服方法で飲めれば OK ですが、飲めなかった場合は、以下のことを試してみてください！！

1. **練薬を作って、お薬を包み込むように**他の食材と混ぜましょう。
練薬と食材をサンドするイメージです！！

* 粉薬ごと混ぜてしまうと、食材の味が変わってしまったり、粉の食感があつたりと、あまりおすすめではないです💧



おすすめ食材…バニラアイス、チョコアイス、チョコクリーム、ゼリー、プリン



注：混ぜると苦みが增強してしまうもの💧

958 スポーツ飲料、ヨーグルト、オレンジジュース、緑茶

2. **内服時の水分は多め**にして、口の中にお薬が残らないようにしましょう。

→牛乳が特におすすめ！

<牛乳での服薬方法>

方法①水の代わりに牛乳で内服する。

方法②水で飲んだ後に、牛乳でお口の中をきれいにすると
苦みが残りにくいです♪

方法③牛乳に粉のまま溶かして飲むとリッチなソフトクリームの味で
飲みやすいです。

* 内服は、食後でなくても、空腹時でも可能です *