

# ジスロマック クラリスロマイシンの飲ませ方



このお薬は、表面に甘いいちごのコーティングがされていますが、コーティングがはがれると中身は苦みがあります。

いつもお子さんが行っている内服方法で飲めればOKですが、飲めなかった場合は、以下のことを試してみてください！！

## 1. 練薬を作つて、お薬を包み込むように他の食材と混ぜましょう。 練薬と食材をサンドするイメージです！！

\*粉薬ごと混ぜてしまうと、食材の味が変化してしまったり、粉の食感があったりと、あまりおすすめではないです。



おすすめ食材…バニラアイス、チョコアイス、チョコクリーム、ゼリー、プリン



**注**：混ぜると苦みが増強してしまうもの

- ・スポーツ飲料、ヨーグルト、オレンジジュース、緑茶

## 2. 内服時の水分は多めにして、口の中にお薬が残らないように しましよう。

→牛乳が特におすすめ！

<牛乳での服薬方法>

方法①水の代わりに牛乳で内服する。

方法②水で飲んだ後に、牛乳でお口の中をきれいにすると  
苦みが残りにくいです♪

方法③牛乳に粉のまま溶かして飲むとリッチなソフトクリームの味で  
飲みやすいです。

\*内服は、食後でなくとも、空腹時でも可能です\*